

**Wykaz chorób przewlekłych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 grudnia 2009r.**

1. Akromegalia
2. Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
3. Choroba Alzheimerera
4. Choroba i zespół Parkinsona
5. Choroba Leśniowskiego-Crohna
6. Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
7. Ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 < 50 % oraz ujemną próbą rozkurczową
8. Cukrzyca
9. Epidermolysis bullosa
10. Fenyloketonuria
11. Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy
12. Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej
13. Jaskra
14. Miastenia
15. Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom
16. Moczówka prosta przysadkowa
17. Mukowiscydoza
18. Neuralgia popółpałcowa przewlekła
19. Niedoczynność tarczycy
20. Nowotwory złośliwe, w tym również:
 - a) neutropenia w chorobach nowotworowych,
 - b) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,
 - c) rak piersi i rak trzonu macicy,
 - d) rak piersi w II rzucie hormonoterapii,
 - e) rak prostaty
21. Osteoporoza
22. Padaczka
23. Padaczka oporna na leczenie
24. Pierwotna dyskineza rzęsek
25. Przerost gruczołu krokowego
26. Przewlekłe owrzodzenia
27. Schizofrenia
28. Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego uporczywego braku współpracy chorego
29. Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
30. Stan po resekcji trzustki

31. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesięcy stosowania
32. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania
33. Stwardnienie rozsiane
34. Stwardnienie zanikowe boczne
35. Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II- NYHA IV
36. Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia
37. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
38. Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięsnych – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110. dnia po przeszczepie
39. Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergii pokarmowe, biegunki przewlekłe
40. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia
41. Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego – prewencja pierwotna